

核准日期：2010年2月20日

修订日期：2019年12月01日



去痛片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：去痛片

英文名称：Compound Aminopyrine Tablets

汉语拼音：Qutong Pian

【成份】本品为复方制剂，其组分为每片含氨基比林 150mg、非那西丁 150mg、咖啡因 50mg、苯巴比妥 15mg。

【性状】本品为白色片。

【适应症】用于发热及轻、中度的疼痛。

【规格】复方

【用法用量】需要时服用 一次 1—2 片，一日 1—3 次。

【不良反应】本复方所含氨基比林和非那西丁均有明显不良反应。服用氨基比林可有呕吐、皮疹、发热、大量出汗及发生口腔炎等，少数可致中性粒细胞缺乏、再生障碍性贫血、渗出性红斑、剥脱性皮炎、龟头糜烂等。长期服用非那西丁可引起肾乳头坏死、间质性肾炎并发生急性肾功能衰竭，甚至可能诱发肾盂癌和膀胱癌，还可造成对药物的依赖性。非那西丁还易使血红蛋白形成高铁血红蛋白，使血液的携氧能力下降，导致紫绀，还可引起溶血、肝脏损害，并对视网膜有一定毒性。

【禁忌】对氨基比林、非那西丁、咖啡因或苯巴比妥类药物过敏者禁用。

【注意事项】（1）本品长期服用，可导致肾脏损害，严重者可致肾乳头坏死或尿毒症，甚至可能诱发肾盂癌和膀胱癌。不宜长久使用，以免发生中性粒细胞缺乏，用药超过 1 周要定期检查血象。（2）氨基比林在胃酸下与食物发生作用，可形成致癌性亚硝基化合物，特别是亚硝胺，因此有潜在的致癌性。（3）长期服用可造成依赖性，并产生耐受。（4）对各种创伤性剧痛和内脏平滑肌绞痛无效。

【孕妇及哺乳期妇女用药】不推荐使用。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】更易致肾功能损害，慎用。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】为一复方解热镇痛药。其中氨基比林和非那西丁能抑制下视丘前列腺素的合成和释放，恢复体温调节中枢感受神经元的正常反应性而起退热作用；同时还通过抑制前列腺素等的合成而起镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放，稳定溶酶体酶，影响吞噬细胞的吞噬作用而起到抗炎作用。咖啡因因为中枢神经兴奋药，能兴奋大脑皮层，提高对外界的感应性，并有收缩脑血管，加强前两药缓解头痛的效果。苯巴比妥具有镇静、催眠、抗惊厥作用，可增强氨基比林和非那西丁的镇痛作用，并预防发热所致之惊厥。

【药代动力学】尚不明确。

【贮藏】密闭，在干燥处保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶，1000 片/瓶。

【有效期】24 个月

【执行标准】卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 WS₁-15 (B) -89。

【批准文号】国药准字 H41020903

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【生产企业】

企业名称：海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址：林州市史家河工业园区

邮政编码：456592

电话号码：0372-6515111

传真号码：0372-6515111

4. 印刷质量

印刷字图清晰，深浅一致，位置准确，无错别字。